

Ime i prezime: **Paripović Lenka (Ana) (2)** Datum rođenja: **2011**
 Adresa: **Novi Sad** Telefon: **0405011805000**
 Uputna dijagnoza: **In obs.**

Nalaz MR pregleda

Datum pregleda: **25.01.2021**

KONTROLNI MR PREGLED LEVOG SKOČNOG ZGLOBA:

Komparacija sa snimcima prethodnog MR (29.07.2020.), ponovljen protokol.

Fokalna intraosealna lezija lokalizovana u distalnoj metafizi fibule prema lateralnom aspektu, jukstakortikalno i neposredno uz fiznu ploču, je u daljoj involuciji u odnosu na prethodni MR: perzistiraju diskretni amorfni fokusi hipointenznog T1 signala, delom sklerotskih karakteristika, uz prateći perzistentni blagi reaktivni edem/hiperemiju u kosnoj srži perifokalno, pri čemu je edem manje izražen i manje ekstenzivan u odnosu na prethodni MR; promena i dalje nema efekat mase, ne uzrokuje kortikalnu destrukciju i nema prateće periostealne reakcije odnosno patoloških alteracija u mekim tkivima paraosealno.

Diskretnija fokalna lezija sličnih karakteristika u distalnoj metafizi tibije prema anteriornom aspektu je takođe u daljoj regresiji, perzistiraju samo diskretne sklerotske iregularnosti oko fizne ploče, bez rezidualnog perifokalnog edema.

Evidentno je prisustvo multiplih intervalno novorazvijenih intraosealnih fokusa T2 FS hipersignala unutar tarzalnih kostiju - talusa, kalkaneusa, kao i delom prikazanih kostiju distalnog reda tarzusa (u navikularnoj, kuboidnoj i u kuneiformnim kostima): fokusi su relativno diskretni, loše definisani, u formi punktiiformnog i mrljastog T2 FS hipersignala i T1 hiposignala; sve lezije su subcentimetarskih dimenzija, relativno najizraženiji odnosno najveći fokusi su u telu kalkaneusa (neposredno posteriorno od posteriornog subtalarnog zgloba na dorzalnom aspektu, promera oko 7mm), kao i u navikularnoj kosti na plantarnom aspektu (promera do oko 9mm) - predstavljaju lezije sličnih karakteristika i iste prirode kao i prethodno verifikovane lezije u distalnom okraju fibule i tibije; nemaju efekat mase, ne uzrokuju kortikalnu destrukciju i nisu praćene patološkim alteracijama u mekim tkivima.

Diskretni fokus sličnih karakteristika i iste prirode prisutan je i u distalnoj metadijafizi fibule na posteriornom aspektu jukstakortikalno, takođe intervalno razvijen u odnosu na prethodni MR (T2 FS hipersignal u zoni promera oko 4mm).

Nema značajne IA efuzije u skočnom zglobu, niti sinovijalnih proliferacija; nema osteohondralnih lezija. U mekim tkivima u pregledom obuhvaćenoj regiji nema relevantnih patoloških promena.

ZAKLJUČAK: 1. DALJA REGRESIJA FOKALNIH INTRAOSEALNIH LEZIJA U DISTALNOJ METAFIZI FIBULE I TIBIJE KOJE SU BILE PRISUTNE NA PRETHODNIM MR PREGLEDIMA.

2. RELATIVNO DISKRETNE INTERVALNO NOVORAZVIJENE MULTIFOKALNE PROMENE SLIČNIH KARAKTERISTIKA U KOSTIMA TARZUSA (SUBCENTIMETARSKIH DIMENZIJA, POJEDINAČNO NAJVEĆE U KALKANEUSU I NAVIKULARNOJ KOSTI 7-9mm) - LEZIJE SU ISTE PRIRODE I MORFOLOŠKI SE UKLAPAJU U SLIKU CRMO (hroničnog rekurentnog multifokalnog osteomijelitisa).

POSREDOVANJE
 ZAVOD ZA DIJAGNOSTIKU

Lekar: **VAMED Dr Boris Petrović**
 NOVI SAD, HAJDUK VELJKOVA 11
 Specijalista radiolog